

高輻射污染 會嘔吐腹瀉

自由時報

更新日期:2011/03/15 04:11

〔自由時報記者魏怡嘉／台北報導〕若發生核安事故，民眾如何得知遭到輻射污染？三總核子醫學部主任鄭澄意表示，遭急性的高劑量輻射污染，會出現噁心、嘔吐、全身倦怠及腹瀉等症狀，多數出現在核電廠工作人員身上。

一般民眾一年人體大約會累積接受二．四毫西弗的輻射背景值，這些輻射來自搭飛機及自然環境，若暴露到很低劑量的輻射，通常不會有明顯感覺，需靠輻射偵測儀檢測才會知道。

輻射量達6000毫西弗恐致命

鄭澄意指出，輻射污染若一次暴露到一百毫西弗以上，就會對身體的血球造成影響；如果一次暴露到二五〇毫西弗以上，就會對造血系統產生傷害，進而出現噁心、嘔吐、全身倦怠等急性輻射症候群；假使劑量再往上增加，就會對腸黏膜造成破壞，進而產生腹瀉，接著破壞血管系統及神經系統；一旦高達六千毫西弗就會對生命造成危害。

衛生署醫事處長石崇良表示，目前國內對於核災急救醫院共可分為三級：核一及核二廠的第一級醫院為台大金山分院；第二級醫院則有淡水馬偕、基隆長庚及署立基隆醫院；第三級醫院則為台大、三總、北榮、台北馬偕及林口長庚等。

核三廠的第一級醫院為枋寮、恆春基督教醫院及署立恆春醫院；第二級醫院則有東港安泰醫院、屏東基督教醫院及署立屏東醫院；第三級醫院則為高雄長庚、高醫及高雄榮總。第一級醫院主要做急救，穩定病患生命跡象，再後送到第二級及第三級醫院。

台大急診主治醫師石富元表示，遭輻射污染經過除污後，輻射劑量仍無法清除，就須隔離治療。

相關知識+

[屏基和東港安泰 哪家醫院風評比較好?! 20點](#)

的風評非常不錯 東港只有兩家醫院，安泰跟輔英，但是...

看完新聞有疑問？

快上知識+[發問更多](#)